

ΜΗΡΟΚΗΛΗ

Μηροκήλη ονομάζεται η κήλη που εμφανίζεται στο μηριαίο δακτύλιο, στο ριζομήριο.

Είναι συχνότερη στις γυναίκες διότι η διάπλαση της πυέλου είναι τέτοια που ασκείται πίεση προς το μηριαίο δακτύλιο, ο οποίος αποτελεί και το ευένδοτο σημείο για την εμφάνιση της. Ο μηριαίος δακτύλιος είναι το άνοιγμα από το οποίο περνούν μύες, νεύρα και αγγεία από την κοιλία προς το μηρό.

Συμπτώματα

Στην αρχική φάση η συμπτωματολογία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ίσως μια ήπια ευαισθησία στην περιοχή με μικρή διόγκωση. Αργότερα εμφανίζεται μόνιμη διόγκωση η οποία σπανίως ανατάσσεται και πολύ συχνά περισφίγγεται, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να χειρουργούνται εκτάκτως.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση του ασθενούς και πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από άλλες παθήσεις της περιοχής, όπως: απόστημα ή θυλακίτιδα ψοίτου μυός, ανεύρυσμα μηριαίας αρτηρίας, κιρσοειδή διεύρυνση μηριαίας φλέβας, διόγκωση λεμφαδένων, λίπωμα και βουβωνοκήλη.

Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική με την ανεύρεση, απολίνωση και εκτομή του κηλικού σάκου αλλά και την πλαστική αποκατάσταση του μηριαίου δακτυλίου. Σπανίως χρειάζεται η τοποθέτηση πλέγματος.




Fig. 1. Frontal view of the uterus and ovaries. Fig. 2. Cross-section of the uterus.

ορισμένης περιόδου, η οποία είναι η περίοδος κατά την οποία η μήτρα αποβάλλει το εμβρυϊκό υλικό. Η περίοδος αυτή διαρκεί συνήθως 3-5 ημέρες, με μέση διάρκεια 4,5 ημέρες. Η αιμορραγία αυτή οφείλεται στην αποβολή του εμβρυϊκού υλικού, καθώς και στην αποβολή του ενδομητρίου, το οποίο έχει αυξηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η αιμορραγία αυτή είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία της γυναίκας. Ωστόσο, εάν η αιμορραγία είναι πολύ άφθονη ή διαρκεί περισσότερο από 7-10 ημέρες, τότε μπορεί να αποτελεί ένδειξη για κάποιο πρόβλημα, όπως η υπερπλασία του ενδομητρίου ή η καρκίνος του ενδομητρίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείται ο γυναικολόγος.