

There are no translations available.

ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

Με τη λέξη χολοκυστεκτομή εννοούμε την επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.
Η χοληδόχος κύστη είναι ένας σάκος σε σχήμα αχλαδιού και βρίσκεται στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλίας, κάτω από το δεξιό λοβό του ήπατος.
Η ρόλος της είναι να αποθηκεύει χολή και

να
την
εκκρίνει
στο
έντερο
διαμέσου
του
χοληδόχου
πόρου
. Η
χολή
εκκρίνεται
μετά
τη
λήψη
τροφής
(
λιπαρής
) και
βοηθάει
στην
πέψη
.

Τα αίτια αφαίρεσης της χοληδόχου κύστεως είναι συνήθως:

- χολολιθίαση (λίθοι στη χοληδόχο κύστη)

- χολοκυστίτιδα (με ή χωρίς χολόλιθους)

- Θηλώματα χοληδόχου κύστεως (καλοήθεις όγκοι του τοιχώματος της χολ. κύστεως)

- κακοήθεια (καρκίνος χοληδόχου κύστεως (εύρημα συνήθως μετεγχειρητικό)

Η χοληδόχος κύστη στο 90% των περιπτώσεων, αφαιρείται **λαπαροσκοπικά**. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες θεωρείται πλέον επιβεβλημένη η έναρξη με τη λαπαροσκοπική μέθοδο και εάν υπάρχει πρόβλημα ο χειρουργός παίρνει την απόφαση για

μετατροπή
σε
ανοιχτή
επέμβαση
. Η
λαπαροσκοπική
δεν
διαφέρει
καθόλου
ως
προς
το
τελικό
αποτέλεσμα
,
έχει
λιγότερες
επιπλοκές
,
λιγότερο
πόνο
και
γρηγορότερη
ανάρρωση
.

Τεχνική λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής

Υπό γενική αναισθησία τοποθετούνται τέσσερα trocars σε συγκεκριμένες θέσεις της κοιλίας .
Γίνεται
εμφύσηση
αέρα
μέσα

στην
κοιλία
και
με
ειδική
μικροκάμερα
,
οθόνη
και
ειδικά
εργαλεία
αφαιρείται
η
χοληδόχος
κύστη
με
το
περιεχόμενο
της. Η
νοσηλεία
μπορεί
να
είναι
μονοήμερη
και ο
ασθενής
επιστρέφει
στο
σπίτι
του.
Μετά
από
μερικές
μέρες
επιστρέφει
στις
καθημερινές
του
δραστηριότητες
και την
εργασία
του.

Τεχνική ανοιχτής χολοκυστεκτομής

Υπό γενική ή υψηλή επισκληρίδιο αναισθησία, γίνεται τομή περίπου 10 εκατοστών στην άνω κοιλία και αφαιρείται η χολή.

Οι συνήθεις επιπλοκές είναι η αιμορραγία, η διαπύηση του χειρουργικού τραύματος, η χολόρροια.

Στην ανοιχτή χολοκυστεκτομή, η πλήρης ανάρρωση επέρχεται μετά τις 6 εβδομάδες

Και οι δύο μέθοδοι είναι εξίσου ασφαλείς. Σίγουρα όμως η λαπαροσκοπική εκτομή είναι καλύτερη λόγω των λιγότερων επιπλοκών και ιδιαίτερα του μετεγχειρητικού πόνου .

Γαγγρινώδης χολοκυστίτις

Μικροχολολιθίαση