

There are no translations available.

ΡΑΓΑΔΑ ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ


Τι είναι η ραγάδα του πρωκτικού δακτυλίου?

Είναι ένα επώδυνο σχίσσιμο του βλεννογόνου του πρωκτικού δακτυλίου και αφορά στο 20% περίπου των παθήσεων της περιοχής. Συχνά συνυπάρχει με άλλες παθήσεις της περιοχής (αιμορροΐδες).

Η θέση εντόπισης είναι συνήθως η 6^η ώρα (προς τον κόκκυγα) και λιγότερο συχνά η 12^η ώρα (προς τα γεννητικά όργανα). Η εντόπιση της σε άλλες θέσεις είναι αποτέλεσμα άλλων παθολογικών καταστάσεων. Εκτείνεται από την οδοντωτή γραμμή (άνω) έως τον πρωκτικό δακτύλιο (κάτω).

Η συχνότερη εμφάνιση της στην 6η ώρα, οφείλεται:

1. στο γεγονός ότι, η ελλειπτική πορεία προς τα οπίσω των μυϊκών ινών του έξω σφιγκτήρα προκαλεί στην θέση αυτή σημείο μικρότερης αντίστασης, ευένδοτο σημείο, με συνέπεια τον ευκολότερο τραυματισμό του καλυπτικού επιθηλίου κατά το πέρασμα σκληρών κοπράνων (Lockhart-Mummery).
2. στην υποάρδευση του οπισθίου τοιχώματος του πρωκτικού σωλήνα, η οποία μπορεί να προκαλεί ισχαιμία με απότοκο το σχίσσιμο του πρωκτικού βλεννογόνου (Shouten κ.ά)
3. μείωση του μονοξειδίου του αζώτου το οποίο αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή των μυϊκών ινών. Η έλλειψη του ΜΟ είναι δυνατόν να προκαλεί αποτυχία χαλάρσεως του έξω σφιγκτήρα (Lund)



ΠΙΝΑΚΑΣ Α